

# Composantes connexes des formes quadratiques non dégénérées

Arnaud GIRAND

17 juin 2012

Référence :

– [FGN10], p. 214–215

**Proposition 1** Soit  $(E, \|\cdot\|)$  un  $\mathbb{R}$ -e.v de dimension finie  $n \geq 1$ .

On munit l'ensemble  $Q(E)$  de la norme  $N : q \mapsto \sup \|x\| = 1 |q(x)|$ . Soit  $\Omega(E)$  l'ensemble des formes quadratiques non dégénérées sur  $E$ .

Alors :

- (i)  $\Omega(E)$  est un ouvert de  $Q(E)$  ;
- (ii) pour tout  $q \in Q(E)$ , il existe un réel  $k > 0$  tel que si  $q' \in Q(E)$  et  $N(q - q') < k$  alors  $q$  et  $q'$  ont même signature ;
- (ii) les composantes connexes de  $\Omega(E)$  sont les ensembles  $\Omega_i(E)$  constitués des formes quadratiques (non dégénérées) de signature  $(i, n - i)$  pour  $i \in \{0, \dots, n\}$ .

DÉMONSTRATION :

- (i) une fois choisie une base de  $E$  on a un isomorphisme  $Q(E) \cong S_n(\mathbb{R})$  et  $\Omega(E) \cong S_n(\mathbb{R}) \cap GL_n(\mathbb{R})$  d'où le résultat.
- (ii) Soit  $q \in Q(E)$  de signature  $(r, s)$ . Comme  $q$  est non dégénérée on a  $r + s = n$ , de fait si on considère une base  $q$ -orthogonale  $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_s)$  convenablement ordonnée (i.e  $q(e_i) = 1$  et  $q(f_j) = -1$ ) on obtient un s-e.v  $F := \langle e_1, \dots, e_r \rangle$  (resp.  $G := \langle f_1, \dots, f_s \rangle$ ) de  $E$  tel que  $q|_F$  (resp.  $q|_G$ ) soit définie positive (resp. définie négative), avec en "bonus"  $E = F \oplus G$ .  $q|_F$  est définie positive donc  $\sqrt{q}$  constitue une norme euclidienne sur  $F$ , qui est donc équivalente à  $\|\cdot\|$ . En particulier, il existe  $k_1 > 0$  tel que :

$$\forall x \in F, \sqrt{q}(x) \geq k_1 \|x\| \text{ d'où } q(x) \geq k_1^2 \|x\|^2$$

En raisonnant de même avec la norme euclidienne (sur  $G$ )  $\sqrt{-q}$  on obtient l'existence de  $k_2 > 0$  tel que :

$$\forall x \in G, q(x) \leq -k_2^2 \|x\|^2$$

Si on pose  $k := \min(k_1^2, k_2^2)$  on a alors :

$$\forall x \in F, q(x) \geq k \|x\|^2 \text{ et } \forall x \in G, q(x) \leq -k \|x\|^2$$

Pour tout  $q' \in Q$  tel que  $N(q - q') < k$  on a :

$$\forall x \neq 0, |q(x) - q'(x)| \leq N(q - q') \|x\|^2 < k \|x\|^2$$

Donc :

$$q(x) - q'(x) < k \|x\|^2 \text{ et } q'(x) - q(x) < k \|x\|^2$$

De fait :

– si  $x \in F \setminus \{0\}$  on a :

$$q'(x) > q(x) - k \|x\|^2 \geq 0$$

– si  $x \in G \setminus \{0\}$  on a :

$$q'(x) < q(x) + k \|x\|^2 \leq 0$$

Donc  $q'$  est définie positive (resp. définie négative) sur  $F$  (resp.  $G$ ) donc a même signature que  $q$ .

(iii) Il est clair que les  $\Omega_i(E)$  forment une partition de  $\Omega(E)$ . Ils sont de plus ouverts par (ii). Ils ne nous reste plus qu'à montrer qu'ils sont connexes, ce que nous traitons matriciellement ( $\Omega(E)$  étant homéomorphe à  $GL_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R})$ ) : soient  $A, B \in GL_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R})$  de signature  $(i, n - i)$ . Alors, par théorème spectral il existe  $P, Q \in O_n(\mathbb{R})$  telles que  $A = {}^t P D_i P$  et  $B = {}^t Q D_i Q$  où  $D_i := \text{diag}(\underbrace{1 \dots 1}_i, \underbrace{-1 \dots -1}_{n-i})$ . Quitte à changer en son opposée la première ligne de  $P$  et/ou  $Q$  on peut supposer  $P, Q \in GL_n^+(\mathbb{R})$  qui est connexe par arc ; donc, si  $\gamma$  y relie  $P$  à  $Q$   $\delta : t \mapsto {}^t \gamma(t) D_i \gamma(t)$  relie  $A$  à  $B$  dans  $GL_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R})$  d'où le résultat.

**Détails supplémentaires :**

–  $GL_n^+(\mathbb{R})$  est connexe par arcs. On utilise la décomposition polaire.

**Références**

[FGN10] Serge Francinou, Hervé Gianella, and Serge Nicolas. *Oraux X - ENS, Algèbre 3*. Cassini, 2010.